

KOIRANPENNUN KEINORUOKINTA

Mikäli narttu kuolee, pentue on liian suuri, narttu ei välitä pennuistaan tai sillä on utaretulehdus tai sen maito ei riitä, joudutaan harkitsemaan pentujen keinoruokintaa. Keinoruokinta on työteliästä puuhaa, mutta se onnistuu, jos on paljon aikaa ja kiinnostusta. Paras ratkaisu olisi löytää pennuille keinoemo, joka imettäisi pentuja ja opettaisi samalla niille sosiaalista käyttäytymistä.

Keinotekoinen maidon korvike

- Sisältää energiaa 370 kcal
- 800 ml kokomaitoa (3%)
- 200 ml 12 % kermaa
- munankeltuainen
- 6 g luujauhoa + vitamiinia (teelusikallinen 4 - 5 g)

Yllämainitut aineet vispataan kuohkeaksi ja kerralla tarfottavaan annokseen lisätään 4 g sitruunahappoa tai pari tippaa sitruunamehua, jotta se ei juoksettuisi.

Lactol-emänmaidonvastike

Vaihtoehtoisena ruokana voidaan pennuille käyttää Lactol-emänmaidonvastiketta, jota saa hyvin varustetuilta kennelosastoilta. Lactol-purkissa on sekoitusohje.

Seosta ei saa tehdä enempää kuin yhtenä päivänä kuluu. Pienelle pentueelle riittää puolet yllämainitusta annoksesta. Seos säilytetään jääkaapissa ja lämmitetään käden lämpöiseksi ennen juottamista.

Vaihtoehtoisesti voi myös käyttää Walthamin Canine Milk Substitute Instant Diet-emänmaidonvastiketta, jota saa eläinlääkäriin reseptillä apteekista.

Pentujen juottamiseen sopii nuken tuttipullo, tippapipetti tai pieni injektioruisku, jonka päähän laitetaan venttiilikumi. Suurille roduille käy tavallinen tuttipullo. Pentuja on juotettava varovasti ja niiden on annettava imeä itse. Pakkojuotolla aiheutetaan helposti ruuan meno keuhkoihin ja keuhkotulehdus, joka usein johtaa eläimen menehtymiseen. Kaikkien ruuanvalmistuksessa käytettävien astioiden ja ruokintavälineiden pitää olla moitteettoman puhtaita.

Pentuja ruokitaan ensimmäisen kolmen viikon aikana 12 kertaa vuorokaudessa. 2,5 - 3 viikon iässä niitä aletaan ruokkia kupista, tällöin riittää 5 syöttökertaa vuorokaudessa. 3 - 4 viikon iässä niille aletaan vähitellen syöttää kiinteää ruokaa.

Päivittäisen maitoseoksen määrä % panosta

- 3 pv ikäiselle 15 - 20 %
- 7 pv ikäiselle 22 - 25 %
- 14 pv ikäiselle 30 - 32 %
- 21 pv ikäiselle 35 - 40 %

Jokaisen suokinnan jälkeen täytyy tuntea vatsalaukku täytenä kylkikaaren takana, etenkin vasemmalla puolella. On hyvä punnita pentu ennen ja jälkeen ruokinnan. Näin voi tehdä annosteluun korjauksia. Jos pennuille antaa liian suuria ruoka-annoksia kerralla, ne saattavat saada ripulin.

Koiran tulisi kasvaa noin 2 - 4 g/pv/kg lopullisesta painosta. Näin ollen esim. koiranpennun, jonka lopullinen paino tulee olemaan noin 10 kg, tulisi kasvaa 20 - 40 g päivässä ja koiranpennun, josta tulee 20-kiloinen, tulisi kasvaa 40 - 80 g päivässä.

Narttukoira laukaisee pentujen ulostamis- ja virtsaamisrefleksit nuolemalla pentujen alavatsaa ja peräaukon seutua. Tätä emon toimintaa voi jäljitellä käyttämällä kostutettua pumpulitukkoa, jolla sivellään pentujen peräpäätä. Normaali uloste on kellertävää ja salvamaista. Jos uloste on vihertävää tai veristä, voi maitoseosta laimentaa puoleen keitetyllä vedellä. Pennuille voi yrittää antaa myös sokerivettä.

Suosittelut ympäristölämpötilat

- 0 - 5 pv 28 - 32 oC
- 5 - 20 pv n. 26 oC
- 20 - 34 pv n.23 oC

Lämpöä voi ylläpitää lämpölampulla, lämpötyynillä ja kuumavesipullolla. Olisi kuitenkin hyvä jos pentujen laatikossa olisi viileämpikin nurkka, jotta ne voisivat valita sopivan lämpötilan.

Pentujen annetaan nukkua häiriintymättä ruokintojen välisen ajan. Yleensä ne nukkuvat rauhallisesti. Jos pennut huutavat ja valittavat kovasti, niillä on nälkä tai kylmä tai molempia.

Ohjeet: Eläinlääketieteellisen korkeakoulun Eläinsairaala, Pieneläinklinikka, Hämeentie 57, 00580 Helsinki